

深圳市 区 医院 社区健康服务中心

姓名 性别 年龄 档案号

肺功能检查知情同意书

肺功能检查是呼吸系统疾病最常用的功能诊断方法之一，包括：肺通气功能检查、弥散残气测试、支气管激发试验、支气管舒张试验及一氧化氮呼气测定。鉴于您的病情，现需要进行肺功能检查，根据病情选择相应的检查项目，检查时间因人而异，请在诊室外静候安排。

一、操作前准备：

为了使您尽快掌握检查方法，正确配合医师的操作，获得可靠的结果，请按如下要求进行准备：

1. 练习以下动作：深吸气后，再快速、爆发力吹气并持续至少 6 秒不中断。
2. 有些项目(支气管激发试验、支气管舒张试验)需按医嘱要求停用相应气管扩张剂，如茶碱类、 β_2 受体激动剂、激素类、抗过敏药等。
3. 检查前可以如常进餐。

二、检查禁忌症和注意事项

虽然肺功能检查是无创性的诊断方法，但也有相关的**禁忌症及注意事项**：

1. 绝对禁忌症：近 3 个月患心肌梗塞、休克；近 4 周出现严重心功能不全、心绞痛；近 4 周出现大咯血；癫痫发作需要用药物治疗；未控制的高血压(收缩压 $>200\text{mmHg}$ ，舒张压 $>100\text{mmHg}$)；主动脉瘤；严重甲状腺功能亢进患者不能进行用力肺功能检查；中度以上肺通气功能障碍、喉头或声带水肿、有超敏反应病史患者禁做支管激发试验；支气管扩张剂过敏者禁用该扩张剂。

2. 相对禁忌症：近期有少量咯血、气胸、巨大肺大泡且做准备手术、血氧饱和度 $<80\%$ 、心率 >120 次/分、心功能不稳定患者、孕妇，需慎行检查。

如有以上情况或病史请务必告知医师暂停肺功能检查，以免出现危险，否则责任自负。

3. 肺功能某些检查项目可能会引起一些不良反应和意外的发生，主要包括：药物过敏、气胸、血氧下降、咳嗽、胸闷、气紧、喘鸣、心悸、手颤、声嘶、咽痛、呕吐、头晕、头痛、面色潮红、心率增快、手麻、抽搐等，极少数并发症严重时可能出现休克，喉头水肿，呼吸衰竭，心律失常，心脏骤停等。上述不良反应一般可经药物治疗或休息后缓解；如未能缓解，肺功能室将会及时进行处理。

患者和监护人已经完全理解以上告知内容，愿意承担以上风险并同意进行肺功能检查，在发生各种不良反应或意外事件时同意医生进行相应的处理，请签字为凭。

患者或监护人签名：

监护人与患者关系：

日期： 年 月 日