

附件 3

学校及托幼机构常见传染病疫情处置参考标准

病种	聚集性疫情判定标准	暴发疫情判定标准	病人 隔离期限	班级停课参考标准	建议 停课 时间
流感	同一班级(或宿舍)短时间内发生多例(1天内发生3例及以上,或1周内发生5例及以上)流感样病例(38℃+咳嗽/咽痛)。	1周内,同一学校、幼儿园等单位发生10例及以上流感样病例,或发生5例及以上因流感样症状住院病例(不包括门诊留观病例),或发生2例以上流感样病例死亡。	症状消失及退热后满48小时。	1周内,急性呼吸道感染现症病例累计达30%或以上,停课; 或经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	4天
新冠病毒感染	同一学校、幼儿园等,1周内发生10例以上新冠病毒感染者。	1周内,同一学校、幼儿园等单位发生10例以上新冠病毒感染者。	发病后7天或核酸(或抗原)检测阴性。	经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	3天
手足口病	1周内,同一幼儿园或学校等发生5例及以上手足口病病例;或同一班级(或宿舍)发生2例及以上手足口病病例(以医院诊断为准)。	1周内,同一学校、幼儿园等单位发生10例及以上。	自发病之日起2周或至症状消失后1周。	出现重症或死亡病例停课; 1周内同一班级出现2例或以上,且经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	10天
疱疹性咽峡炎	同一班级1周内发生5例及以上疱疹性咽峡炎病例。	1周内,同一班级发生10例及以上疱疹性咽峡炎病例。	自发病之日起至症状消失且不少于发病后1周。	出现重症或死亡病例停课; 1周内同一班级出现5例或以上,且经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	5天
流行性腮腺炎	同一班级(或宿舍)1天内发生3例及以上,或1周内发生5例及以上。	1周内,同一学校、幼儿园等单位中发生10例及以上病例。	发病后9天。	经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	25天

水痘	同一班级（或宿舍）1天内发生3例及以上，或1周内发生5例及以上。	1周内，同一学校、幼儿园等单位中，发生10例及以上病例。	全部水疱干燥结痂或不少于病后14天。	经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	21天
猩红热	同一班级（或宿舍）1天内发生3例及以上，或1周内发生5例及以上。	1周内，同一学校、幼儿园等单位中，发生10例及以上病例。	发病后满10天或开始服足量抗生素24小时后且热退。	经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	7天
诺如病毒感染性腹泻	同一班级（或宿舍）1天内发生3例及以上，或1周内发生5例及以上感染性腹泻或呕吐病例。	3天内，同一学校、幼儿园等单位中发生10例及以上病例。	临床症状消失后3天；厨工需连续2次（间隔24小时）肛拭子诺如病毒核酸检测阴性。	1周内，同一班级新增病例数达到全班总人数15%或以上，经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课；1周内，同一班级新增病例数达到全班总人数30%或以上，停课。	3天
急性出血性结膜炎	同一班级（或宿舍）1天内发生3例及以上，或1周内发生5例及以上。	1周内，同一学校、幼儿园等单位中，发生10例及以上病例。	7天。	急性出血性结膜炎现症病例累计达30%或以上停课。	7天
麻疹	10天内，同一学校、幼儿园等单位中，发生2例及以上的病例。		无呼吸道并发症的患者隔离至出疹后5天，有肺炎并发症的患者隔离至出疹后10天。	经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	21天
风疹	10天内，同一学校、幼儿园等单位中，发生2例及以上的病例。		隔离至出疹后5天。	经卫健和教育部门进行风险评估后判定是否停课。	21天

备注：1. 急性呼吸道感染症状包括下列症状之一即可：腋温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 、咳嗽、咽痛、流鼻涕；

2. 停课时间：自末例病例脱离班级时起算。